

הנחיות לטיפול בפצע שהודבק

מה מותר לעשות לאחר הדבקה? מה אסור? ומה מומלץ לעשות כדי לקבל את התוצאה האסתטית הטובה ביותר?

ילדכם טופל על ידי הצוות במחלקה לרפואה דחופה לילדים, שולי הפצע הודבקו בדבק ביולוגי מיוחד שהונח מעל החתך.

תוך מספר שניות הדבק יוצר שכבה שקופה, אטומה וגמישה המצמידה את שולי העור.

שכבה זו מתקלפת בהדרגה עד להיעלמותה תוך כשבוע ימים.



מה אסור לעשות לאחר ההדבקה?

- ✓ אין להרטיב את אזור ההדבקה במשך 48 שעות!
- ✓ אין להסיר מדבקות שהונחו על גביי ההדבקה.
- ✓ רצוי להמעיט במגע עם אזור החתך. מומלץ לא לשפשף או לקלף את שכבת ההדבקה.

מה מותר לעשות לאחר ההדבקה?

- ✓ 48 שעות לאחר ההדבקה ניתן להרטיב את הפצע (אך לא להשרות במים או לשחות בבריכה).
- ✓ אם הילד סובל מכאב מותר לקחת משככי כאבים כגון נורופן או אקמול.

מתי מומלץ לפנות להערכה חוזרת של רופא?

- ✓ עליית חום מעל 38 מעלות.
- ✓ הופעת נפיחות, אודם או הפרשה באזור ההדבקה.
- ✓ הופעת דימום מאזור ההדבקה.
- ✓ הופעת כאבים עזים באזור ההדבקה.

על מנת לקבל תוצאה קוסמטית מיטבית מומלץ בחצי השנה לאחר היווצרות החתך להימנע ככל הניתן מחשיפת אזור הצלקת לשמש ולהקפיד על מריחת האזור בקרם בעל מקדם הגנה גבוה.